

## إعادة علاج عصب/جذور الأسنان غير الجراحية



فرصة اخرى لإنقاذ سنّك

### ماهي المضاعفات المحتملة التي قد تحدث عند عملية إعادة علاج جذور الأسنان غير الجراحية؟

هذه المضاعفات لا تؤدي بالضرورة إلى فشل العلاج، بل يتم التعامل معها وفق الحالة وفي بعض الحالات قد تتطلب إعادة علاج الجذور الجراحية أو خلع السن (في حالات محدودة)

عملية إعادة علاج جذور الأسنان غالبا تتطلب مهارة أعلى من عملية علاج الجذور الأولية وتتم غالبا من قبل طبيب متخصص في علاج جذور الأسنان.

في عملية إعادة علاج الجذور قد تحدث بعض المضاعفات (وهذه المضاعفات قد تحدث أيضا في عملية علاج الجذور الأولية) وتشمل التالي:

- حدوث ثقب في جذر السن
- انحراف عن مسار القناة الأصلي
- انفصال أدوات علاج العصب داخل جذر السن
- خروج بعض حشوة العصب في العظم المحيط بالسن
- عدم القدرة على تنظيف القناة بالكامل بسبب انسدادها أو انحرافها خلال علاج الجذور السابق
- كسر جذر السن

#### من إعداده:

ريناد العنزي  
بسمة برناوي

#### إشراف:

د. منال القاضي

هذا المشروع التعليمي (المطوية) هو جزء من تعاون مشترك بين شعبة لب وجذور الأسنان بكلية طب الأسنان بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والجمعية السعودية لعلاج جذور وأعصاب الأسنان.



## ماهي الأسباب التي تدعو إلى عملية إعادة علاج جذور الأسنان غير الجراحية؟

2. في حال كانت جودة علاج الجذور السابق كافية، قد يستدعي ذلك إعادة علاج الجذور (غير الجراحي) في الحالة التالية:

قبل وضع تليبيسة أو حشوة جديدة وعند وجود علامات واضحة تدل على حدوث تسرب للميكروبات إلى داخل قنوات الجذور مثل وجود تسوس أو حشوة مكسورة يصاحبها تغير في لون حشوة العصب إلى الأسود وغالبا مع وجود رائحة تعفن

### ! ملاحظة:

في حال كانت جودة علاج الجذور السابق كافية، ولكن مع استمرار وجود ألم في السن أو بقاء الالتهاب في العظم بنفس الحجم السابق أو زيادة حجمه أو ظهور انتفاخ/خراج/ صديد حول السن فإن ذلك قد يستدعي علاج العصب الجراحي (إزالة الالتهاب أو الخراج وقطع ذروة السن بواسطة الجراحة)

## ماهي الأسباب التي تدعو إلى عملية إعادة علاج جذور الأسنان غير الجراحية؟

1. عند وجود علامات في صور الأشعة تدل على أن جودة علاج الجذور السابق غير كافية مثل قصر طول حشوة العصب أو وجود قنوات غير معالجة، فإن ذلك يستدعي إعادة علاج الجذور (غير الجراحية) في الحالات التالية:

- قبل وضع تليبيسة جديدة وإن لم يكن هناك أي أعراض مثل ألم السن أو التهاب في العظم
- استمرار وجود التهاب في العظم المحيط بذروة جذر السن بعد علاج الجذور السابق (الالتهاب يظهر في صور الأشعة بنفس الحجم السابق بعد مرور أكثر من سنة من العلاج أو يزداد حجمه)
- وجود أعراض جديدة أو استمرار الأعراض السابقة مثل ألم في السن أو خراج (انتفاخ) أو خروج صديد حول السن

## ماهي أنواع الإجراءات التي يتم من خلالها إعادة علاج عصب/جذور الأسنان؟

- إعادة علاج عصب/جذور الأسنان غير الجراحية
- إعادة علاج عصب/جذور الأسنان الجراحية

## ماذا نعني بعملية إعادة علاج عصب/جذور الأسنان غير الجراحية

هي إجراء يتم فيه إزالة حشوة العصب السابقة. بعد ذلك تُنظف قنوات الجذور باستخدام أدوات خاصة تشمل المبرد اليدوية والآلية، ويتم تعقيمها بالسوائل المخصصة، ثم يعاد حشو القنوات بحشوة الجذور المناسبة، وتغلق فتحة السن بحشوة مؤقتة أو دائمة حسب الحالة.

